

SUSPENSÃO DE MEDICAMENTOS

Alessandro Silvestre, Yuri Heluany

MEDICAMENTOS	TEMPO DE SUSPENSÃO
IECA/BRA (<i>Losartan, Valsartan, Aradois, Benicar, Enalapril, Captopril</i>) Bloque Canal Calcio (<i>Anlodipino, Nifedipina, Diltiazem</i>) Diuréticos (<i>Furosemida, Hidroclorotiazida, Clortalidona</i>)	No dia da cirurgia
Insulinas (<i>Humalog®, Novarapid®, Novolin R®, Humulin R®</i>)	Suspender durante o jejum
Insulinas Lenta: NPH (<i>Humulin L®, Novolin L®</i>)	Reduzir 30% da dose durante o jejum
Insulinas Lenta: Detemir (<i>Levemir®</i>) Degludeca (<i>Tresiba®</i>) Glargina (<i>Lantus®</i>)	Reduzir 30% da dose 72h antes do procedimento
Tirofiban (<i>Agrastat®</i>)	8 horas
Heparina de Baixo Peso Molecular (HPBM)	Profilática - 12 HORAS Terapêutica - 24 HORAS
*Dipiridamol (<i>Persantin®</i>)	24 horas
Glipizida (<i>Minidiab®</i>) Glibenclamida (<i>Daonil®, Lisaglucon®, Glicamin®, Glionil®</i>) Glimepirida (<i>Amaryl®, Azulix®, Betes®, Bioglic®, Diabemed®, Diamellitis®, Gliansor®, Glimepibal®, Glimepil®, Glimeprid®, Glimeprida®, Glimeran®, Glycopirida®</i>) Glicazida (<i>Diamicron®, Gilcaron®, Azukon®</i>) Lixisenatida (<i>Lyxumia®, Soliqua®</i>)	24 horas
*Rivaroxabana (<i>Xarelto®</i>) *Apixabana (<i>Eliquis®</i>) *Edoxabana (<i>Lixiana®</i>) *Cilostazol (<i>Cebralat®, Claudic®, Elmiron®, Vasativ®, Vasogard®, Pletal®</i>) Liraglutida (<i>Victoza®, Saxenda®, Xultophy®</i>) Sulfato Ferroso (<i>Vitafer®, Hematofer®</i>) Fibras alimentares	48 horas
Insulinas Intermediária: NPH (<i>Humulin N®, Novolin N®</i>)	Reduzir 50% da dose na manhã do procedimento
*Dabigatrana (<i>Pradaxa®</i>)	<u>-SEM</u> DOENÇA RENAL-72 HORAS <u>-COM</u> DOENÇA RENAL -96 HORAS
Dapaglifozina (<i>Forxiga®, Xigduo®</i>) Empaglifozina (<i>Jardiance®</i>) Bupropiona+Naltrexona (<i>Contrave®</i>)	3 DIAS
Ertuglifozina (<i>Steglatro®</i>) Canaglifozina (<i>Invokana®</i>)	4 DIAS

MEDICAMENTOS	TEMPO DE SUSPENSÃO
*Varfarina (Marevan®, Coumadin®, Marfarin®, Warfarin®) *Clopidogrel (Clopin®, Clopidror®, Aterogrel®, Iscover®, Clopivix®, Plaquevix®, Plaq®, Clopido-Gran®, Lopigrel®, Plagrel®, Plavix®) *Ticagrelor (Brilinta®)	5 dias
*Prasugrel (Effient®) *Abciximab (Reopro®)	7 dias
Orlistate (Xenical®, Lipiblock®, Lipoxen®, Orlipid®, Lystate®, Xenilipi®) Ginko Biloba	7 dias
AAS (Aspirina®)	Suspender 7 dias antes de Neurocirurgias, RTU de próstata/bexiga, cirurgias oftalmológicas
*Ticlopidina (Ticlid®, Plavasc®, Plaketar®, Ticlobal®, Desagreg®)	10 dias
Dulaglutida (Trulicity®) Tirzepatida (Mounjaro®)	15 dias
Semaglutida (Ozempic®, Rybelsius®, Wegovy®)	21 dias
Sildenafil (Escitan®, Tantrix®, Havante®, Videnfil®, Sollevare®, Suvvia®, Avafil®, Blupill®, Dejavu®, Ah-zul®, Vasifil®, Virineo®, Viasil®, Revatio®, Viagra®) Tadalafila (Cialis®) Vardenafila (Levitra®, Vivanza®) Avanafila (Spedra®, Stendra®)	Hipertensão Pulmonar - NÃO SUSPENDER Disfunção erétil - 15 dias

ATENÇÃO

Os medicamentos com * devem ser suspensos no tempo citado, mas após avaliação do seu médico